

## Efeito da poda fitossanitária no rendimento de frutos de morangueiro

**Mauro Porto Colli<sup>\*</sup>**; Eduardo Willian De Lima; Lucas Zanella; Felipe Narcizo;  
**João Remigio.**

Sociedade Porvir Científico – Escola Agrícola La Salle

\*Email: mauro.colli@lasalle.org.br

Uma alternativa ao manejo de doenças na cultura do morangueiro é a poda fitossanitária, porém são insipientes as informações a respeito da frequência desta prática. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da frequência da poda no rendimento do morangueiro. Foi utilizado delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos correspondem à limpeza de folhas, frutos ou ambas as partes combinadas com frequências de uma vez por semana, duas vezes por semana, quinzenais, mensais e a testemunha sem poda. Foram avaliadas as variáveis: número e rendimento de frutos. Os resultados da análise de variância demonstram efeito para a variável rendimento de frutos. A testemunha apresentou maior rendimento de frutos com 564,06 g planta<sup>-1</sup> quando comparado com os tratamentos com frequência de uma e duas vezes por semana. A remoção de folhas e frutos doentes influencia no rendimento de frutos.

**Palavras-chave:** *Fragaria x ananassa*, manejo, doenças.

**Apoio:** Sociedade Porvir Científico – Escola Agrícola La Salle