Anais do SEPE – Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão
Vol. IX (2019) – ISSN 2317-7489

CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE VOLUMOSOS E SUPLEMENTAÇÃO MINERAL NA DIETA EM REBANHOS LEITEIROS NA REGIÃO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL NO ANO DE 2019

Rodrigo Dombroski (apresentador)[1]
Jocemar Barcelos Portela[2]
Décio Adair Rebellatto da Silva[3]

Resumo:. O setor leiteiro, tem papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Brasil, gera empregos em uma cadeia produtiva ramificada. Muitas vezes é, a principal fonte de renda de agricultores. O leite e os seus derivados são extremamente importantes na alimentação humana e animal, considerado excelente fonte de cálcio e proteína. Em consequência destas circunstâncias, aliado aos poucos dados referentes a produção leiteira, especialmente no Noroeste do Estado, buscou-se informações em 21 propriedades da região, escolhidas de forma aleatória utilizando o método de entrevistas. Em todas as propriedades é realizada a produção de silagem. Utilizando apenas milho como espécie forrageira foram 80% dos entrevistados, 20% utilizam trigo, aveia branca ou sorgo. Em 57% das propriedades ocupam-se até 10 hectares para silagem, 19% de 11 a 20 hectares. No inverno destaca-se a aveia ou o consórcio de aveia/azevém utilizado em 57% das propriedades. Apenas o azevém é utilizado em 43% e pastagem nativa 19%. No verão, o tyfton é utilizado em 71% das propriedades, capim sudão 57%, sorgo forrageiro 38% e pastagem nativa 29%. Quanto ao fato de utilizarem pastagens perenes o tyfton aparece em 90% das propriedades a pensancola em 5%, e em 5% das propriedades não possuem forrageiras perenes. Por fim, ainda referente a nutrição do rebanho leiteiro, obteve-se dados referentes a suplementação mineral, onde todas as propriedades a realizam, sendo efetuada a suplementação mineral por diferenciação de fase em 86% destas. Em face dos dados apresentados, nota-se elevada produção de silagem de milho, sendo a aveia, consorciada com azevém a principal forrageira de inverno para pastejo, enquanto que o tyfton se destaca como a principal forrageira perene de verão, e a condizente utilização da suplementação mineral.

[1] Acadêmico de Agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, rodrigo.dombroski@outlook.com
[2] Acadêmico de Agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, jocemarportela@gmail.com
[3] Professor Doutor, Médico Veterinário, Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, decio.rebellatto@gmail.com

Palavras-chave: Bovinocultura de leite. Nutrição de Bovinos. Forragicultra.

Categoria: UFFS - Pesquisa
Área do Conhecimento: Ciências Agrárias

Formato: Comunicação Oral