



CARACTERIZAÇÃO DE ÓBITOS POR SUICÍDIO OCORRIDOS NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, RS

Luis Felipe Chaga Maronezi (apresentador)¹

Guilherme Assoni Gomes²

Jeanice de Freitas Fernandes³

Ivana Loraine Lindemann⁴

Resumo: O suicídio caracteriza-se como uma situação de violência autoprovocada na qual o indivíduo realiza atos de autoagressão e obtém sucesso em tirar sua própria vida. Apresenta-se como um fenômeno complexo e multifatorial, sendo resultado de interações entre fatores biológicos, psicológicos, socioculturais e ambientais. Dados gerais demonstram que o suicídio ocorre em 06 a cada 100 mil habitantes e está entre as 10 principais causas de morte na população mundial. Contudo, no Brasil tornou-se de notificação obrigatória apenas no ano de 2011, quando o país ocupava o oitavo lugar dentre aqueles com maiores números absolutos de óbitos por suicídio ao ano. Consonante a isso, o presente estudo buscou determinar o número de óbitos por suicídio ocorridos no município de Passo Fundo – RS, entre os anos de 2013 e 2017, bem como, caracterizar o perfil da população acometida. Para isso, foi realizado um estudo ecológico compreendendo todos os casos de suicídio notificados no Sistema de Informações Sobre Mortalidade – SIM/RS entre 01/01/2013 e 31/12/2017 e a caracterização dos casos foi feita através dos dados oriundos de Declarações de Óbitos. As informações foram recebidas do Departamento de Gestão da Tecnologia da Informação – Núcleo de Informação em Saúde (NIS), em formato de planilha eletrônica, contemplando as variáveis de sexo, idade, cor da pele, situação conjugal, escolaridade, local de ocorrência, causa da morte e método escolhido. A estatística descritiva foi realizada por meio do programa PSPP (distribuição livre) e o protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul. A amostra foi composta por 148 casos, com predomínio do sexo masculino (73,6%), idade entre 30 e 49 anos (36,5%), cor da pele branca (91,9%), sem cônjuge (59,3%) e com ensino fundamental completo (28,9%). Quanto às características associadas à prática do suicídio, verificou-se que 50% das mortes ocorreram dentro do próprio domicílio e, quase 40%, em instituição hospitalar.

¹ Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, *campus* Passo Fundo, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional De Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). E-mail: luisfelipemaronezi@hotmail.com

² Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, *campus* Passo Fundo, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica e Inovação (PROBIC/PROBITI) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). E-mail: guilgomes@hotmail.com

³ Enfermeira atuante da prefeitura de Camargo, RS. E-mail: jeanice.fernandes@uffs.edu.br

⁴ Doutora e docente do Curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul, *campus* Passo Fundo. E-mail: ivana.lindemann@uffs.edu.br



Prevaleceu a causa de asfixia (48,6%) e o método de enforcamento (33,1%). Dados semelhantes são frequentemente relatados na literatura, evidenciando uma forte relação entre sexo e idade e o ato efetivo do suicídio, de modo que, homens apresentam taxas superiores ao sexo oposto pela adoção de métodos mais agressivos. Em relação à idade, é notável que adultos jovens, recém incluídos nas responsabilidades da vida adulta, também são os mais afetados, seja pela pressão social ou pela dificuldade de se estabelecer uma estabilidade financeira. Ademais, pesquisas quanto ao suicídio vêm sendo constantemente desenvolvidas, demonstrando a fundamental necessidade de novas discussões quanto ao assunto e possibilitando, talvez, possíveis qualificações ao atendimento das populações de risco, visando reduzir o número de ocorrências.

Palavras-chave: Suicídio. Tentativa de suicídio. Óbito.

Categoria: UFFS - Pesquisa

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde

Formato: Comunicação Oral