

**PERFIL DE UMA AMOSTRA DE PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE
EMBOLECTOMIA**

ZANELLA, N.^[1]; PINHO, M. L. B.^[1]; YUSUF, K. M.^[1]; ACRANI, G. O.^[2];
TIGRE, E. L.^[2]; LINDEMANN, I. L.^[2]

A oclusão arterial aguda é um evento potencialmente fatal, onde um êmbolo viaja pela corrente sanguínea e obstrui um vaso, causando isquemia dos tecidos por este irrigados. A embolectomia é um dos procedimentos cirúrgicos realizados para o tratamento desta condição e consiste na remoção do êmbolo por meio do cateter de Fogarty. A fim de descrever o perfil sociodemográfico e de saúde de pacientes submetidos à cirurgia de embolectomia em um hospital no norte do Rio Grande do Sul foi realizado um estudo transversal e descritivo, realizado com pacientes submetidos à cirurgia vascular entre 2019 e 2022 no Hospital de Clínicas de Passo Fundo-RS, mediante aprovação ética (parecer de número 6.557.308). A coleta de dados ocorreu por meio do sistema de prontuários eletrônicos (PEP). Os dados foram digitados em banco criado no *software* EpiData e detalhados no PSPP (ambos de distribuição livre), com frequências absolutas das variáveis sociodemográficas, comorbidades e estágios clínicos. A partir desses dados a amostra foi composta por 100 pacientes submetidos à cirurgia de embolectomia, dos quais 57,0% eram do sexo masculino, 35,0% tinham entre 70-79 anos, 99,0% eram brancos, 74,0% eram procedentes de outras cidades que não Passo Fundo, 49,0% eram casados e 75,3% tinham o ensino médio incompleto (n=77). Acerca das características de saúde desses pacientes, 33,8% eram tabagistas (n=80), 66,3% eram portadores de hipertensão arterial sistêmica (n=92), 30,4% tinham dislipidemia (n=92), 25,0% possuíam diabetes mellitus tipo 2, 25,8% apresentavam doença renal crônica (n=93), 47,8% tinham doença arterial obstrutiva periférica (n=92) e 5,4% tiveram infarto agudo do miocárdio prévio (n=92). Além disso, 71,7% (n=92) tiveram a embolectomia realizada nos membros inferiores, 19,0% evoluíram para alguma amputação e 11,0% dos pacientes da amostra foram à óbito. Os resultados, por sua vez, demonstram que o perfil do paciente submetido à embolectomia é, majoritariamente, composto por indivíduos brancos, hipertensos, idosos e com o segmento dos membros inferiores sendo o mais acometido. Os resultados obtidos nesse estudo estão de acordo com os encontrados na literatura.

Palavras-chave: Embolectomia com balão; Epidemiologia; Procedimento Cirúrgico Vascular.

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde

Origem: Pesquisa

Instituição Financiadora/Agradecimentos: Estudo sem financiamento

Aspectos Éticos: Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Fronteira Sul (CEP-UFFS) sob o parecer 6.557.308

[1] Natan Zanella. Medicina. Universidade Federal da Fronteira Sul. natanzanella@outlook.com.

[1] Marcus Levi Braga Pinho. Medicina. Universidade Federal da Fronteira Sul.

[1] Karima Muhammad Yusuf. Medicina. Universidade Federal da Fronteira Sul.

**XIII
SEPE**
Seminário de Ensino,
Pesquisa e Extensão

BIOMAS DO BRASIL: DIVERSIDADE, SABERES E TECNOLOGIAS SOCIAIS

14 A 18 DE OUTUBRO



[2] Gustavo Olszanki Acrani. Docente do curso de Medicina. Universidade Federal da Fronteira Sul.

[2] Eduardo Lima Tigre. Docente do curso de Medicina. Universidade Federal da Fronteira Sul.

[2] Ivana Loraine Lindemann. Docente do curso de Medicina. Universidade Federal da Fronteira Sul.