INTERFERÊNCIA DA ÉPOCA DE EMERGÊNCIA DO NABO SOBRE COMPONENTES DE PRODUTIVIDADE NA CULTURA DO TRIGO

Sandra Petry¹
Lucas Andrey Schwerz²
Tadeu Werlang³
Ana Caroline Pereira da Luz⁴
Vinícius Cavalli Pozzo⁵
Siumar Pedro Tironi⁶

Categoria: Pesquisa⁷

Resumo: As plantas daninhas competem com as culturas de interesse por luz, água, nutrientes e espaço ocasionando redução dos atributos de produtividade. O nabo (*Raphanus raphanistrum*), pertencente à família Brassicaceae, é uma espécie muito utilizada para rotação de culturas e como cobertura de solo durante o inverno, desse modo essa espécie torna-se uma das principais espécies daninhas que competem com a cultura do trigo. Com isso, realizou-se um trabalho, a campo, com o objetivo de avaliar a interferência da época da emergência do nabo em relação a cultura do trigo sobre os atributos produtivos dessa cultura. O trabalho foi realizado na área experimental da Universidade Federal da Fronteira Sul *campus* Chapecó, o solo da área é classificado com um Latossolo Vermelho. A semeadura da cultivar de trigo TBIO Sinuelo foi realizada com espaçamento entre linhas de 0,17 m, densidade de semeadura de 300 sementes por m² e adubação de base e cobertura realizada com adubo formulado, conforme análise de solo. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições, as parcelas foram constituídas por 16 linhas, com 5 m de comprimento (13,6 m²). Os tratamentos utilizados foram compostos por diferentes épocas de emergência do nabo em relação ao trigo, sendo eles: emergência do nabo aos 20 dias antes da emergência do trigo (DAET), 10 DAET, junto à emergência do trigo, 10 dias depois da emergência do trigo (DDET), 20 DDET e por uma testemunha sem competição. No

¹ Estudante de agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul, *campus* Chapecó/SC. sandrapetry@outlook.com;

² Estudante de agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul, *campus* Chapecó/SC. lucas.schwerz1994@gmail.com;

³ Estudante de agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul, *campus* Chapecó/SC. tadeuwerlang@gmail.com;

⁴ Estudante de agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul, *campus* Chapecó/SC. anacarolinebera@hotmail.com;

⁵ Estudante de agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul, *campus* Chapecó/SC. vinicius_pozzo@hotmail.com;

⁶ Professor Dr. de agronomia, Universidade Federal da Fronteira Sul, *campus* Chapecó/SC. siumar.tironi@gmail.com;

⁷ Formato: Pôster

momento em que a cultura atingiu o estágio de maturação plena foram realizadas as avaliações dos atributos de produtividade: número de espigas por m², através da contagem das espigas contidas em um quadrado de 0,5 m de lado lançado aleatoriamente no interior da área útil das parcelas; e número de grãos por espiga, realizado através da contagem dos grãos em 10 espigas coletadas, aleatoriamente, na área útil da parcela. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e quando significativos foram comparados pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Observou-se que ambas as variáveis não apresentaram diferença estatística. O número de espigas por m² apresentou média geral de 148,78, já para o número de grãos por espiga a média geral foi de 41,22 grãos por espiga. Conclui-se que a competição causada pelo nabo que emergiram em diferentes épocas em relação ao trigo não interfere no número de espigas por m² e também no número de grãos por espiga da cultura.

Palavras-chave: *Triticuma aestivum*, *Raphanus raphanistrum*, competição.